

PESTA PORCINA

Stimată doamnă/Stimate domn,

Având în vedere evoluția agresivă a **pestei porcine africane** în România, în condițiile în care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atât din exploatațile non profesionale, cât și din exploatațile comerciale, vă aducem la cunoștință că **este imperios necesar să țineți cont de următoarele aspecte:**

- primele semne ale pestei porcine africane (PPA) pot fi cu greu observate;
- simptomele pestei porcine africane (PPA) apar mai ales în formele preacute sau acute;
- fermierii pot observa cu ușurință o serie de **manifestări** care indică îmbolnăvirea porcilor cu pesta porcină africană (PPA) astfel:

o un **deces inexplicabil** în efectivul de porci, este semn clar că trebuie să vă alarmați, să raportați situația atât medicului veterinar, cât și autorităților sanitar-veterinare;

o **febra ridicată**, de circa 40-42 de grade Celsius, este un alt posibil semn al îmbolnăvirii porcilor cu PPA ;

o porcii bolnavi cu PPA prezintă **înroșiri ale pielii**, simptom ce poate fi sesizat mai mult la animalele cu pielea deschisă. Acest simptom apare mai ales în vârful urechilor, la coadă, pe piept și/ sau în zona abdomenului;

o **pierderea poftei de mâncare**, a animalului, este un alt semn care trebuie să vă îngrijoreze.

■ porcii cu PPA își pierd energia, devin apatici și înainte de deces cu 24-48 de ore își pierd coordonarea motrică.

o **scroafele bolnave de PPA avortează**. Boala afectează în mod egal masculii și femelele, iar îmbolnăvirea nu este influențată de vârstă.

o porcii cu PPA pot prezenta **stări de vomă, diarce (uneori cu sânge) și scurgeri la ochi**.

OBLIGAȚIILE care revin crescătorilor de porcine:

- să crească porcii în **spații împrejmuite**, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, microclimat și bunăstare;
- sa elimine posibilitatea de a veni în **contact cu porci străini** de curtea acestora, cu porci mistreți sau cu alți proprietari de porci domestici;
- **să nu intre în adăposturile unde sunt crescuți porcii, cu încălțăminte și hainele purtate pe stradă**, pe domeniul public; Este recomandată chiar dezinfecția la intrarea în adăpost, prin punerea unei tăvițe cu paie îmbibate în soluții dezinfectante;
- **să nu cumpere purcei din locuri necunoscute**, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- **să anunțe imediat medicul veterinar** de apariția oricărui semn de boală sau mortalitate la animalele proprii;
- să nu hrănească animalele cu **resturi alimentare** provenite de la carnea de porc gătită în familie;
- dacă există vânători în familie, care aduc **carne de mistreț**, sub nicio formă să nu dea porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau a resturilor de carne;
- să nu scoată scroafele sau vierii din exploatație în scopul **montei cu animale din altă exploatație**;
- nu folosească în hrana animalelor **iarbă culeasă de pe câmp**, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi;
- să respecte legislația privind **ecarisarea teritoriului**, prin predarea cadavrelor de la porcine moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul autorităților locale.

PENTRU ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ TREBUIE ANUNȚAT IMEDIAT MEDICULUI VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ CONCESIONAR SAU DSVSA.

Toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii ai căror porci sunt identificați (crotaliați) și înregistrați în Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiți către stat, la prețul de piață al animalelor