




Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 710/13-04-2020

Buletin de avertizare nr.23

Condițiile climatice din ultima perioadă a favorizat apariția bolilor și daunătorilor: VIESPEA CU FERASTRAU A MARULUI, RAPAN, FAINARE, MONILINIA, FOCUL BACTERIAN (HOPLOCAMPA T., VENTURIA L., PODOSPHERA L., MONILINIA L., ERWINIA A.), la samantoase cu unul din produsele:

Nr. crt.	Denumire ppp	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, %,recomandata /ha	Observatii
1	DECIS 25WG	Viespea merelor *	0,003%	Cantitatea de apa utilizata/ha-1500 l, Pentru samantoase
	FINT PLUS 64 WG+	Rapan, fainare	0,125%	
	ALCUPRAL 50PU	Focul bacterian-postfloral	0,04%	
2	DECIS 25WG+	Viespea merelor	0,003%	Cantitatea de apa utilizata/ha-1500 l, Pentru samantoase
	SHAVIT F72WDG+	Rapan, fainare	0,2%	
	ALLIETE 80WDG	Focul bacterian-in timpul infloritului	0,3%	
3	DECIS 25WG	Viespea merelor	0,02%	Cantitatea de apa utilizata/ha-1500 l, Pentru samantoase
	FONTELIS	Rapan, fainare	0,75 l	
4	FASTAC 10 CE+	Viespea merelor	0,015%	Cantitatea de apa utilizata/ha-1500 l, Pentru samantoase
	ORIUS25EW	Fainare, rapan	0,05%	

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Viespea cu ferastrau a marului ataca toate soiurile , dar cele mai mari pagube le produce la cefe cu infflorire timpurie . Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului cand 10-15% din flori au inceput sa-si scuture petalele.

Tratamentele au actiune preventiva si curativa reducand atacul cat si posibilitatea tramsiterii (agentilor de daunare).

Metode profilactice de combatere:

- in regiunile cu conditii favorabile dezvoltarii agentilorde daunare se vor cultiva soiuri rezistente.
- toate tratamentele se vor executa pe timp linistit ,fara vant.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate prin triplă clătire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995,Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic.De asemenea ,instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale

Sa utilizeze numai produse de protectia planterlor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform cu: Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si nr. 3242 /103 / 21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila pe o perioada de cel putin 3 ani!

Atentie ! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (salcia, pomi fructiferi,rapita).

Înainte de utilizarea instalației de aplicat PPP, verificați dacă aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiți operatorul pe linie de utilizare a PPP și întocmiți procese verbale.

Se va respecta de către toți utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de Protecția Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,

alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței PPP pe care le utilizează, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei

Nume și prenume fermier / Societate comercială-----

Domiciliu fermier/sediu societate (Comuna, județ)-----

Ferme (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratărilor cu produse de protecție a plantelor


Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data încaperii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea PPP folosit	Doza Omologată/doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67. (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

Dr. Ing. OANA MARIA



Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA




Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro

PRIMĂRIA COMUNEI OSTROVENI
Județul DOLJ
Nr. 2177
Ziua 15 Luna 04 Anul 2020



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 711/13.04.2020

Buletin de avertizare Nr. 24

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea agenților de daunare: PLOSNITA CEREALELOR, GANDACUL BALOS, AFIDE, MUSTELE CEREALELOR (EURYGASTER SP., LEMA M., SCHIZAPHIS G., OSCINELLA P. etc.).

Nr.crt	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandată %, l/kg/ha	Observatii
1	KARATE ZEON	Plosnita cerealelor, gandacul balos	0,15 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
2	NOVADIM PROGRESS	Plosnita cerealelor	3 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
3	DECIS 25 WG	Plosnita cerealelor	0,030 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
4	MAVRIK 2F	Plosnitele cerealelor,afide	0,2 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
5	FASTER 10 EC	Plosnita cerealelor Gandacul ovazului	150 ml 100 ml	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
6	FURY 10 EC	Plosnita cerealelor, gandacul ovazului	0,1 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
7	SUMI ALPHA 5 EC	Plosnita cerealelor, gandacul balos	0,2 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
8	BISCAYA 240 OD	Plosnita cerealelor, gandacul balos	0,2 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
9	ALFAMETRIN 10 EC	Plosnita cerealelor, gandacul ovazului	100 ml	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Alte măsuri de combatere recomandate:

Pentru combaterea plosnitei cerealelor se recomandă executarea tratamentului la o densitate de:

- > 5-7exemplare/mp.,pentru culturile cu densitate și stare de vegetație normale;
- > 3-5 exemplare/mp.pentru culturile cu densitate redusă de plante, neînfratite și stare de vegetație slabă.

Pentru culturile de grau pentru producere de samanta 3 exemplare/mp.

- > Pentru gandacul balos densitatea este de 10 exemplare/mp.
- > Pentru -viespea graului-20% plante atacate-GA
- mustele cerealelor-10% plante atacte -GA

Pentru protecția culturilor de grau fata de atacul piosnitelor se recomanda aplicarea cu rigurozitate si in mod permanent a unui sistem complex de masuri:

-aplicarea unei agrotehnici superioare, care sa asigure culturi bine dezvoltate, cu plante viguroase, capabile sa suporte mai usor atacul, iar pe de alta parte, organizarea combaterii directe a piosnitelor.

-executarea unui control in lanurile de grau la sfarsitul luni aprilie-inceputul lunii mai , iar daca se gaseste o densitate mai mare de 3 exemplare /mp, se impune efectuarea tratamentelor chimice.

-urmarirea dinamicii depunerii pontei in cursul lunii mai si stabilirea gradului de parazitare, precum si aparitia larvelor de varsta a 3-a pentru a stabili oportunitatea executarii celui de al doilea tratament.

-cele mai indicate masuri de combatere sunt: aratura de vara si mai ales de toamna, intretinerea terenurilor incat sa nu fie posibila dezvoltarea gramincelor spontane.

- toate tratamentele se vor executa pe timp linistit ,fara vant, fara ploaie la temperatura <25 de grade Celsius,lar viteza vantului <5m/secunda.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate prin tripla clătire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995 Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 43/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si infocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjuratori

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform cu: Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si nr. 3242 /103 / 21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila pe o perioada de cel putin 3 ani!

Atentie ! In perioada aceasta sunt inflorite unele specii melifere (salcia, pomi fructiferi,rapita, artar).

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatori profesioniști a prevederilor art. 67,

alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei PPP pe care le utilizeaza, pe o perioada de cel puțin 3 ani, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.


Nume și prenume fermier / Societate comercială: _____
 Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet): _____
 Fermă (nume/numar, adresa): _____

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua lună, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire sau folosit	Doza Omologată/doza folosită	Suprafața			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)


Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,
Dr. Ing. GANA MARIA


Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA


Elisabeta Draganeanu



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Oficiul Fitosanitar

Nr. 712/13-06-2020

Buletinul de avertizare Nr. 25

În spațiile protejate ciclui I de cultură pentru prevenirea și combaterea agenților de daunare: PATAREA UNGHIULARĂ, MANA, FAINARE, OFILIREA BACTERIANĂ A TOMATELOR, PATAREA CAFENIE, ALTERNARIA BOLI VASCULARE+ACARIENI, MUSCULITA ALBA, AFIDE, TRIPS (PSEUDOMONAS S., PHYTOPHTORA I., CLADOSPORIUM F., SEPTORIA L., FLUVIA F., ALTERNARIA S.,)-BOLI VASCULARE (-DIDYMELLA L., FUSARIUM O., RHIZOCTHONIA S., PHYTOPHTHORA F., PHYTOPHTHORA I.), se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor după cum urmează:

	Denumirea PPP	Cultura și agentul de daunare combătut	Doza recomandată %; l, kg /ha	Observații
1	ORTIVA TOP + ACTARA 25 WG	Ardei+tomate+vinete -putregaiul cenușiu, mană, patarea cafenie, fainarea, alternarioza Castraveti -fainare, mană Musculita alba de sera, trips	1 l 0,02%	Cantitatea de apă utilizată: conform instrucțiunilor de pe etichetă.
2	MELODY COMPACT 49 WG+ MOSPILAN 20 SP + VERTIMEC PRO	Ardei -bășicarea fructelor Castraveti -mană, patarea unghiulară Tomate -mană, alternarioza, bășicarea fructelor paduchele verde, musculita alba de sera, tripsi acarieni, paianjeni	0,2% 0,025% 1,2 l	Cantitatea de apă utilizată: conform instrucțiunilor de pe etichetă.
3	DITHANE M 45 + FASTAC 10 EC + NISSORUN 10 WP	Castraveti -antracnoza cucurbitaceelor, alternarioza Tomate - bășicarea fructelor de tomate, patarea cafenie. paduchele verde, musculita alba de sera acarieni	0,2% 0,02% 0,04%	Cantitatea de apă utilizată: conform instrucțiunilor de pe etichetă.
4	CUPROFIX ULTRA+ LASER 240 SC + VERTIMEC PRO	Tomate -mană, bășicarea fructelor, alternarioza, patarea punctiformă Castraveti -alternarioza, mană, patarea pustulată, putregaiul rădăcinilor și fructelor Vinete -mană, alternarioza bășicarea fructelor, patarea pustulată Musculita alba de sera, musca miniera Acarieni, paianjeni	1,6-2,4 kg 1,4-1,8 kg 1,4-1,8 kg 0,05% 1,2 l	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
5	EQUATION PRO +	Tomate -mană, alternarioza, fainare	0,4 kg	Cantitatea de apă utilizată: Conform instrucțiunilor de

	NUPRID 200 SC	Tomate+castraveti -tripsul tutunului, musculita alba de sera paduchele verde	0,075% 0,04%	pe eticheta.
6	ALCUPRAL 50 PU + POLECI + NISSORUN 10 WP	Tomate-mana,alternarioza,patarea frunzelor,si basicarea fructelor Castraveti - mana cucurbitaceelor,patarea unghiulora Tomate,ardei,castraveti-Musculita alba de sera, afide,tripsi castraveti-acarieni	0,05% 0,5% 0,04%	Cantitatea de apa utilizata:Conform instructiunilor de pe eticheta.
7	CABRIO TOP + FASTAC 10 EC	Tomate - mana ,alternarioza, fainare, putregai, patarea cafenie, patarea alba Musculita alba de sera, paduchele verde	0,15-0,2% 0,02%	Cantitatea de apa utilizata:Conform instructiunilor de pe eticheta.
8	TOPSIN 70 WDG	Ardei, vinete-ofilirea vasculara Tomate- fuzarioza	0,05-0,10%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
9	CAPTAN 80 WDG	Tomate-mana si ardeilor, patarea dintr-o tomateilor Castraveti-mana castravetilor	0,15%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
10	FOLPAN 80 WDG	Tomate-rizoctonia,caderea plantuteilor	0,15%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
11	PREVICUR ENERGY	Tomate-mana, caderea rasadurilor	0,1%	Se uda cu 300 ml/planta
12	TOPSIN 500 SC	Tomate-fuzarioza, ofilirea vasculara Ardei, vinete-ofilirea vasculara	0,07-0,14%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta
13	MERPAN 80 WDG	Tomate-putregaiul plantelor, putregaiul radacinilor, mana de sol	0,15%	Se uda cu solutie 0,5 l/planta

Produsele să fie fitosanitare trebuie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Metode profilactice de combatere:

- > Rotatia culturilor
- > Igiena culturala
- > Alternati produsele fitosanitare, incercand sa nu utilizati de doua sau mai multe ori consecutiv aceeași substanta activa
- > Nu udati in exces, irigati pe bilioane, efectuati aerisiri zilnice, mai ales in zilele calduroase pentru a evita aparitia bolilor care sunt favorizate de temperaturi ridicate si umiditate in exces.
- > Udarea se face echilibrat, in functie de temperatura exterioara
- > La nevoie, dupa plantare, mai ales daca nu s-a efectuat dezsectia solului, la 7-10 zile se efectueaza tratament cu unul din produsele mentionate.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT

Pentru primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Dr. Ing. OANA MARIA
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdotj@anfop.ro

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform cu: Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TE/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si nr. 3242 /103 / 21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafata agricole si silvica sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila pe o perioada de cel putin 3 ani!

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate prin triplă clătire și separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate și pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereeturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului după utilizarea produsului constituie contravenție și se sancționează conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit. b.

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de Protecție Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/> norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67,

alin.1 din Reg.(CE) nr.1107/2009 privind mentinerea evidentei PPP pe care le utilizeaza, pe o perioada de cel puțin 3 ani, se sancționează cu amendă de la 6.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Locul de domiciliu/ sediu social: SC(Cozuna, judec)-----

Firma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunătorii/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omio gată/doza folosită	Suprafața ha			

Conferin Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății

Coordonator
Dr. Ing. OANA MARIA
 Fitosanitar
 DOLI

Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA

Dr. Ing. OANA MARIA
 Coordonator
 T +40(251) 448191
 of.doli@anf.ro



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077150

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro

PRIMĂRIA COMUNEI OSTROVEI
Județul DOLJ
Nr. 2123
Ziua 15 Luna 04 Anul 2020.

PLANT HEALTH
2020

Oficiul Fitosanitar

Nr. 713/13.04.2020

Buletin de avertizare nr. 26

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților de daunare: **MELCI FARA COCHILIE (AGRIOLIMAX) SI MELCI CU COCHILIE (HELIX POMATIA) LA CULTURILE DE LEGUME (CARTOF, VARZA, CONOPIDA, SALATA, SPANAC, FASOLE, MAZARE)+ COROPISNITE (tomate), IN SPATII PROTEJATE SI CAMP.**

Pentru combatere se recomanda utilizarea unui produs de protectia plantelor:

Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Observatii
1 AGROSAN B	Melci fara cochilie	15 kg	Administrare pe sol fara incorporare- legume camp, la aparitia daunatorului in cultura.
2 ALLOWIN	Melci fara cochilie (Ilimacsi), melci	5,0 kg	Aplicat cu 7 zile inainte de semanat sau plantat (varza, fasole, spanac, mazare) cat si in vegetatie. Pentru cartof aplicat cu 7 zile inainte de inflorit pana la disparitia acestora
3 META GOLD 3%	Melci	7,0 kg	Aplicat de la plantat pana la formarea capatani (salata)
4 META GOLD 5%	Melci	4,0 kg	Aplicat de la plantat pana la formarea capatani (salata).
5 OPTIMOL	Melci fara cochilie (Ilimacsi), melci	5,0 kg	Aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat atunci cand se semnăleaza prezenta daunatorului in cultura (varza, mazare, fasole, conopida spanac). Pentru cartof aplicat cu 7 zile inainte de inflorit pana la disparitia acestora
6 SLIMAX	Melci fara cochilie (Ilimacsi)	7,0 kg	Administrare pe sol fara incorporare- (salata, varza, conopida, spanac) la aparitia daunatorului in cultura
7 COROCID SUPER	Coropisnite (tomate)	20kg	Administrare pe sol fara incorporare- (tomate) la aparitia daunatorului in cultura

Pragul economic de daunare este de 1-2 Ilimacsi /mp.

Perioada optima de tratament cand apar semne ca daunatorii sunt in cultura (urme de mucus alb lipicios).

Produsele se pot utiliza la plantare si in timpul vegetatiei prin imprastierea uniforma la suprafata solului in benzi corespunzatoare randurilor de plantat sau sub forma de mici cantitati de granule din loc in loc cu respectarea dozei la hectar.

Masuri profilactice de daunare:

- aratul sau sapatul efectuat din toamna;
- lucrari repetate ale solului-praslia(sapatul periodic);
- respectarea unei densitati optime(plante prea dese mentin umiditatea si creaza conditi optime pentru melci).

Sa se utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT (<https://aloe.anfd.ro/>).

PENTRU PRIMARI: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje” - www.aforum.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contravenție si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (salcia, pomi fructiferi,rapita, artar).

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic.De asemenea ,instruiti operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normale de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015,cu ACA si NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor/2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala: _____
 Domiciliu Fermier/sediu social SC(Comuna, judet): _____
 Fermă(nume/numar.adresa): _____


REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza a culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunătorii/buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata ha	Canități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, partând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,
Dr. Ing. OANA MARIA



Consilier,
DRAGANEANU Elisabeta



Dr. Ing. OANA MARIA
 Coordonator
 T +40(251) 448191
 ofdolj@anfoc.ro